

# 皆さんに **もっと** 知してほしい **ガバペンチン**

企画: HappyCat【web猫がくしゅう塾】  
制作協力: 坂崎清歌先生・佐藤藍子先生

監修: 獣医師 入交眞巳先生



猫ちゃんの不安や恐怖を和らげる効果がある「ガバペンチン」というお薬があるんですよ!

イラスト: いのぼん

実は、人・動物で抗てんかん薬や神経性疼痛の緩和に使用されているお薬なんです。

**興奮抑制作用**

↓

**緊張緩和**

脳に作用する!

薬を使うなんて… なんだか心配です

とても怖がりなニャー助ちゃん

## ガバペンチンが必要なときはいつ?

不安や緊張、恐怖を感じる様々な場面!

慣れない場所

引越し、来客など

知らない人が触ってくる

車など長時間の移動

ドヤドヤ

バタバタ

猫は日常の変化に敏感です。いつもと違うだけでも非常にストレスを感じる動物。強い不安や怖い経験をさせてしまうことはできる限り無くしてあげるべきです。ガバペンチンは、そんな猫ちゃんの心の負担を減らすために活用できるのです!



例えば、動物病院での来院時… 強い恐怖を感じさせてしまう診察方法では、心身共に余分な負担をかけます。そして、さらに動物病院が苦手になり、必要な治療や検査が困難になってしまうことに…

## どれくらいの量?

猫ちゃんでは1頭あたり50~100mg、もしくは、体重1kgあたり10~20mgの量を使用しますが、効き具合により調節します。そのため、何もない別の日にご自宅で一度効果を確認してから、本番(通院など)で使用することをおすすめします。

※ シロップ剤に含まれるキシリトールは少量で、猫の健康に影響はないとされてます

例えば5kgの子なら 1/4~1/2錠

8.2mm

200

ほぼよく効果が出て量も問題なさそう

時間 変化 動画やメモ 様子

## どうやって飲ませるの?

不安や緊張を取り除きたいタイミングの1.5~2時間前に服用します。苦味があるため、カプセルやオブラートに包み、液体状のオヤツ、少量のウェットフードなどに混ぜて与えることが多いです。(うちの子にあった方法でok)

- 来院の1.5~2時間前に服用する
- 静かに様子をチェック
- キャリーに入れて病院へ
- 病院に到着したら静かに待機
- 診察を手早く進める
- 帰宅

緊張緩和効果は、現れてから約1~2時間ほど持続しますが、個体差があります。その後は、徐々にいつもの様子に戻っていきます。

興奮してるよ

好物にかきつけて

いけよおとなしい?

おちついた雰囲気

大きめの毛布やバスタオル

上部が大きく開くキャリー

そーっ

慣れない場所

引越し、来客など

知らない人が触ってくる

車など長時間の移動

ドヤドヤ

バタバタ

怖い体験 不快な気持ち

動物病院 もっと大嫌いに

次の診察時も 大暴れ!!

通院も 不可能に…

体調不良とメンタルのWストレスに!!

ゼエゼエ

4!!

例えば、動物病院での来院時… 強い恐怖を感じさせてしまう診察方法では、心身共に余分な負担をかけます。そして、さらに動物病院が苦手になり、必要な治療や検査が困難になってしまうことに…

腎臓から排泄される薬のため、腎機能が弱っている子や、高齢、健康状態がわからない子には量を少なくしたり、使用中止にすることもあります。又、妊娠中や授乳中の使用は勧められません。

眠気

段差やキャットタワーからの落下に注意!

※ 検査などで絶食絶水を指示されている場合は獣医師に飲ませ方を相談して下さい

## 副作用や帰宅後の注意点は?

ガバペンチンの副作用は、ほとんど無いと言われてはいますが、眠気、四肢の脱力、ふらつきが見られることがあります。(まれに嘔吐、下痢、食欲低下) その他、血圧がやや低値になることや、心エコーや神経学的検査に影響が出ることが知られています。血液検査データへの影響については報告された例はありません。

ふらつき

眠気

腎臓から排泄される薬のため、腎機能が弱っている子や、高齢、健康状態がわからない子には量を少なくしたり、使用中止にすることもあります。又、妊娠中や授乳中の使用は勧められません。

段差やキャットタワーからの落下に注意!

※ 検査などで絶食絶水を指示されている場合は獣医師に飲ませ方を相談して下さい